

Estimado Padre o Tutor,

Su niño acaba de tener cirugía dental bajo una anestesia general. Como todos los niños responden en manera diferente a tales procesos, hemos recopilado información que enfrentará algunas preocupaciones comunes.

Nauseas y Vómitos

Cada niño reacciona de manera diferente a la anestesia. Cualquier náusea o vómito que pueda ocurrir, durará muy poco tiempo. Si acaso su niño vomita, espere por lo menos 30 minutos antes de darle líquidos tal como agua o bebidas gaseosas. Si la náusea no ocurre, puede progresar lentamente hacia una dieta regular. Intente darle caldos, galletas saladas, y después comidas sólidas.

Sangramiento y Dolor

Los niños responden de manera diferente al dolor y, por lo tanto, es posible que tengan o no tengan dolor en la boca después de la cirugía. Si es necesario, usted le puede dar Tylenol de Niños o Motrin* para hacerlo más cómodo. Es posible que haya un poco de sangramiento alrededor de las encías. Las encías se estrujan y reciben limpieza durante la cirugía y por eso es normal que tengan un poco de sangramiento después de la cirugía dental. Eso se resolverá después de unos días. Si le sacaron dientes a su niño, puede tener molestias y sangramiento. Si la boca de su niño comienza a sangrar excesivamente, por favor llame a Art of Pediatric Dentistry.

Fiebre

Después de cualquier proceso quirúrgico, una fiebre baja (99-100F) es normal. Usted le puede dar Tylenol de Niños o Motrin* a su niño. Si la fiebre continúa a más de 101.5 F por 24 horas, favor de llamar a Art of Pediatric Dentistry.

Actividad

Su niño puede sentirse con sueño por las siguientes 24 horas. Esto es debido al medicamento que su niño ha recibido. Favor de no dejar al niño solo. El niño debe descansar en casa, pero puede andar activo. Por favor asegúrese de que su niño se abstenga de ejercicio que requiere que reaccione rápidamente por 24 horas. Se le anima a que vuelva a la actividad normal el día después de la cirugía. Mantenga a su niño apoyado en una almohada mientras duerme. Revise a su niño cada 20-30 minutos para asegurarse de que responde.

Dolor de Garganta

Su niño puede tener un dolor de garganta debido a los efectos de los gases de anestesia; esto se resolverá dentro de 48 horas.

Posoperativo

Favor de programar una visita posoperativa al tiempo de la cirugía. Si tiene otras preguntas o preocupaciones, favor de llamar a Art of Pediatric Dentistry al 425-401-1147 o 206-331-0915.

*Nota: Con todos medicamentos, siga las instrucciones del fabricante que se encuentran en el paquete para administrar drogas. La aspirina es contraindicada para los niños.